

Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

1,2,3 зөв бол А

1,2,3,4 зөв бол В

2,4 зөв бол С

Зөвхөн 4 зөв бол Д

Бүгд зөв бол Е

**Хэт авиан шинжилгээгээр ихэр жирэмснийг
үнэлэхтэй холбоотой зөв мэдээллийг заана
уу.**

1. Жирэмсний эхний 3 сард ихэсжилтийн хэлбэрийг тогтооно
2. “Т” болон “Лямбда” шинж эхний 3 сард илүү тод харагдана
3. Хоёр өөр хүйсийн урагт монохорион хэлбэрийн ихэсжилт тодорхойлогдох ёсгүй
4. Эхний 3 сард ихэсжилтийг тогтоогоогүй, ургийн хүйс ижил бол монохорион ихэр гэж үзнэ
5. Ихэр урагтай жирэмсний зулай ахар сүүлний уртыг 8- 10 долоо хоногтойд хэмжих нь илүү бодитой байна

2 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Эх доторх ихэр жирэмсний нэг ураг эндэхтэй

холбоотой зөв мэдээлэлийг нэрлэнэ үү

1. Нөгөө ураг эндэх эрсдэл 15%
2. Амьд үлдсэн ураг мэдрэлийн хүнд гэмтэлтэй төрөх эрсдэл 25%
3. Дутуу төрөх эрсдэл 60-70%
4. Жирэмсний <24 өмнө нэг ураг эндэхэд амьд үлдсэн урагт мэдрэлийн хүнд гэмтэл тохиолдох нь илүү
5. Амьд үлдсэн ургийг 28 долоо хоногтойд MRI хийж тархины гэмтлийг үнэлнэ.

3 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Эхний 6 дахь долоо хоногтойд “Vanishing Twin

syndrome” буюу нэг ураг алга болох шинж тохиолддог.

Энэ нь ойролцоогоор хэдэн хувьд илрэх вэ?

1. 3-5%
2. 5-10%
3. 10-15%
4. 15-20%
5. 20-25%

4 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Жирэмсний 30 долоо хоногтойгоос өмнөх хугацаанд ургийн өсөлтийн саатлын үед юуг үндэслэн төрөлтийн төлөвлөлтийг боловсруулахыг зөвлөсөн бэ?
удирдамжаар

1. КТГ
2. Венийн цоргоны цусны урсгалын Допплер
3. Умайн Артерийн Допплер
4. Хүйн артерийн Допплер
5. Ургийн тархины дунд артерийн Допплер

5 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Жирэмсэн үед В вирусын гепатитын DNA хэдээс дээш бол 28 долоо хоногтойгоос вирусын эсрэг тенофовир эсвэл телбивудин хэрэглэхийг зөвлөсөн бэ?

1. $\geq 50,000 \text{ IU/ml}$
2. $\geq 100,000 \text{ IU/ml}$
3. $\geq 150,000 \text{ IU/ml}$
4. $\geq 200,000 \text{ IU/ml}$
5. $\geq 250,000 \text{ IU/ml}$

6 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Ургаас урагт цус юүлэгдэх хам шинжийн хэт авиан оношилгоонд суурилсан QUINTERO -ийн ангилалын 2-р үе шатны ангилалд аль хамаарах вэ?

1. Судасны Допплер хэвийн байна
2. Ураг орчмын шингэний ихсэлт ба багасалт
3. Хүлээн авагч урагт гидропс илэрнэ
4. Донор урагт давсаг харагдахгүй
5. Ургийн зүрхний гажиг илрэх нь цөөнгүй

1. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв
2. 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв
3. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв
4. Зөвхөн 4-р хариулт зөв
5. Бүх хариулт зөв

7 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Хүүхдэд сэтгэл зүйн гэмтлээс үүссэн хор нөөөг илрүүлэх CRIES асуумжийн аргаар хэдэн онооноос дээш бол гэмтлийн дараах хүнд стресс гэж үнэлэх вэ?

1. 20
2. 30
3. 35
4. 40
5. >45

8 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Бэлэг бойжлын үе гэдэгт хэдэн насыг хамааруулах вэ?

1. 8-16 нас
2. 8-18 нас
3. 8-19нас
4. 10-16нас
5. 10-19 нас

9 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Урагт хэт авиан шинжилгээгээр Биофизик үзүүлэлт <2-оос бага оноотой үед урагт хүчилшилт үүсэх магадлал хэдэн хувь вэ?

1. 20%
2. 40%
3. 60%
4. 80%
5. 100%

10 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Хожуу илрэх өсөлтийн саатлын эмнэлзүйд хамааралтайг нэрлэ

1. Нийт өсөлтийн саатлын 30% орчмыг эзэлнэ.
2. Ургийн биофизик үзүүлэлт хэвийн бус байна.
3. Жирэмсний холбоотой А/Д ихсэлтийн шалтгаантай шууд хамааралтай
4. Ураг хэт жижиг биш
5. Пренатал эндэгдэл эрт үеийн өсөлттэй харьцуулахад өндөр

11 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Төрөлхийн тэмбүүгийн оношилгооны “гол шалгуур”-ыг нэрлэнэ үү.

1. Ринит
2. Ам уруулын цуурал
3. Тунгалаг булчирхайн томрол
4. Остеохондритит
5. Өргөн суурьтай кондилом

12 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

ХХВ-ийн эсэрг вакцинтай холбоотой зөв мэдээлэлийг нэрлэнэ үү

1. Дөрвөн цэнт вакцин бэлгийн үү үүсэх эрсдэлийг бууруулна
2. ХХВ-ийн 16 ба 18 хэв шинжийн өмөнгөөс >90% хамгаална
3. Вакцинд 9-13 насны охидыг хамруулна
4. Вакцин нь сулруулсан амьд вакцин тул эх, урагт сөрөг нөлөө үзүүлнэ
5. Дараагийн 2 дахь тунг 3 сарын дараа хийнэ

13 Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно)

MRI шинжилгээгээр умайн хүзүүний хортой хавдрыг оношлох ба тунгалагын булчирхайн үсэрхийллийг илүү сайн оношилно.

1. Зөв, Зөв, Зөв
2. Зөв, Зөв, Буруу
3. Зөв, Буруу, Буруу
4. Буруу, Зөв, Буруу
5. Буруу, Буруу, Буруу

14 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Жирэмсний тээлтийн эхний 3 сарын хэт авиан оношлогоонд хамааралтай зөв мэдээллийн нэрлэнэ үү.

1. Ураг хэвийн байрлалтай үед цээж эрүүний хооронд ураг орчмын шингэн харагдах ёсгүй.
2. УЗЦ 37 хоногтойгоос тодорхойлогдоно
3. Ургийн зулай ахар сүүл нь бага байх нь ураг өсөлтгүй болохын урьдал шинж
4. Тээлтийн 10 дахь долоо хоногоос тархины судаслаг багц харагдана
5. Жирэмсний тээлтийн хугацааг 7-8 долоо хоногтойд үнэн зөв тогтооно

15 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Жирэмсний 11-13+6 долоо хоногт ургийн бүтцийн алийг нь тодорхойлох шаардлагатай вэ?

1. Хүзүүний арын тунгалаг зай
2. Сарвуу тавхайн хэвийн байрлал
3. Давсаг
4. Уруул
5. Хүйн судас

16 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Эмэгтэй жирэмслэх хүсэлтэй бол умайн хүзүүний хортой хавдрын аль шат хүртэл умайг авах төгс мэс засал хийхгүй байж болох вэ?

1. IA1
2. IA2
3. IB
4. IIA
5. IIB

17 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үйл ажиллаганы насжилтын STRAW10+ шатлалаар цэвэршихэд шилжих хожуу шатанд хамааралтайг нэрлэнэ үү

1. Гурван жил хүртэл үргэлжилнэ
2. БЮМ 60 ба түүнээс дээш хоногоор саатна
3. ФСД >25 IU/l байна
4. Антрал фолликулын тоо маш цөөрнө
5. Ингибин В хэмжээ нэмэгдэнэ

18 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Цэвэршилтийн үед жирэмслэхээс сэргийлэх талаарх зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. Бичил болон бага тунтай этинилэстрадиол агуулсан бэлдмэл тохиромжтой
2. Дааврын хавсарсан эм нь цэвэршилтийн шинж тэмдгийг бууруулах ач холбогдолтой
3. ДХЭ-ийг хэрэглэхдээ тромбоз үүсэх эрсдэлийг үнэлнэ
4. Хуанлын аргыг зөвлөхгүй
5. 50 ба түүнээс дээш настай эмэгтэйчүүдэд сүүлийн биеийн юм ирснээс хойш жирэмслэхээс сэргийлэх шаардлагагүй

19 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Дараах эмгэгүүдээс аль нь ясны сийрэгжилт үүсгэх өндөр эрсдэлтэй вэ?

1. Кушингийн хам шинж
2. Гипертиреодизм
3. Гиперпаратиреодизм
4. Хэрлэгийн шалтгаант үений үрэвсэл
5. Элэг ба бөөрний архаг үрэвсэл

20 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Цэвэршилтийн үед даавар нөхөх эмчилгээнд хэрэглэгддэг бэлдмэлүүдийг нэрлэнэ үү

1. Дан эстроген
2. Эстроген ба гестаген
3. Эстрогены авуурт сонгомол үйлчлэх модулятор
4. Гонадомиметик
5. Тестостерон

21 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Цэвэршилтийн үед дараах дааврын бус эмүүдийн алийг нь хэрэглэх вэ?

1. Клонидин
2. Тиболон
3. Габапентин
4. Пароксетин
5. Флюоксетин

22 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Дараахаас өндгөвчийн хортой хавадр үүсгэх
эрсдэлтэйг нэрлэнэ үү

1. Өндгөвч уйланхайжих
2. Удамшил
3. BRCA 1 ба BRCA2-ын мутац
4. Оройтож цэвэрших
5. Линчийн хам шинж

23 Олон зөв хариултыг сонгоно уу.

Жирэмсний лютеома -той холбоотой зөв мэдээлэлийг нэрлэнэ үү

1. Жирэмсэн үед дааврын идэвхижилтэй холбоотой үүснэ
2. Өндгөвчийн эд шар биежсэн тулгуур эдээр солигдоно
3. Дахих эрсдэл өндөртэй
4. Эхэд эрших шинж илэрнэ
5. Эрэгтэй ураг төмсөгний хавдар үүсэх эрсдэлтэй

24. Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Өндгөвчийн хавдрын үсэрхийлэлийн индекс (RMI) хэдээс дээш оноотой бол үсэрхийлэх эрсдэлтэй гэж үзэх вэ?

1. $RMI > 50$ оноо
2. $RMI > 100$ оноо
3. $RMI > 150$ оноо
4. $RMI > 200$ оноо
5. $RMI > 250$ оноо

25 Зөв нэг хариултыг сонгоно уу.

Уялдуулан сонгох сорил. Доорх биомаркерыуд нь ямар хавдруудыг илрүүлэх боломжтойг тохируулан сонгоно уу

1. CEA (cancer embryonal antigen) /B/
 2. AFP (Alpha-Fetoprotein) /C/
 3. ЛДГ (лактодегидрогеназа) /A/
 4. Ингибин А ба В /D/
 5. СА-125 (cancer antigen 125) /E/
- А. Дисгерминома
В. Өндгөвчийн муцинозын хортой хавдар
С. Шар уургийн хүүдийн хавдар
D. Өндгөвчийн бэлгийн татлагын хавдар
E. Өндгөвчийн хучуурын хавдар

1. 1C 2B 3A 4D 5E
2. 1B 2C 3D 4A 5B
3. 1C 2A 3B 4D 5E
4. 1B 2C 3A 4D 5E
5. 1A 2E 3C 4D 5B

26 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Жирэмслэхээс өмнө фолийн хүчил ууснаар урагт мэдрэлийн гуурсны гаж хөгжил үүсэх эрсдэлийг хэдэн хувь бууруулах вэ?

1. 11%
2. 26%
3. 50%
4. 72%
5. 90%

27 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Дэлхийд хамгийн түгээмэл тохиолдох нэг генийн эмгэгт аль нь хамаарах вэ?

1. Гемоглобинопати
2. Гликоген нөөцлөгдөх өвчин
3. Фенилкетонури мутаци
4. Уйланхайт фиброз
5. Дюшены булчингийн дистрофи

28 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Жирэмсний аль хугацаанаас агаарын тээврээр зорчихыг зөвлөдөггүй вэ?

1. 26 долоо хоног
2. 28 долоо хоног
3. 30 долоо хоног
4. 32 долоо хоног
5. 36 долоо хоног

29 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)


Жирэмсэн үед Кортикотропийн сэдээгч дааврын анхдагч эх үүсвэр аль нь болохыг нэрлэнэ үү?

1. Ихэс
2. Ургийн бөөрний дээд булчирхай
3. Ургийн харааны товгор
4. Эхийн харааны товгор Хорион бүрхүүл

Оноо: 1

30 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Дауны хам шинжийг илрүүлэхэд Жирэмсний 19-24 долоо хоногтойд ургийн арьсны зузааны босго хэмжээ зурагт харуулсан цагаан тэмдэгтээр хэд бол эерэг гэж үзэх вэ?



1. ≥ 6 мм
2. ≥ 7 мм
3. ≥ 8 мм
4. ≥ 9 мм
5. ≥ 10 мм

31 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Mirror буюу толин тусгал хам шинжид дараахаас аль нь хамаарах вэ?

1. Эхийн хаван
2. Артерийн даралт ихсэлт
3. Шээсээр уураг алдах
4. Ургийн гидропс
5. Элэгний трансаминаз ихсэх

32 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Ургийн тахиаритми гэдэг нь ургийн зүрхний цохилт 1 минутанд 180-200 удаа болохыг хэлнэ. Ямар шалтгаанаас үүсэх вэ?

1. Бамбайн дутагдал
2. Ургийн халдвар
3. Манас таталтын урьдлын хүнд хэлбэр
4. Ургийн цус багадалт
5. 28 долоо хоног хүртэл урагт илэрч болно

33 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Ургийн уушгины хөгжлийг үнэлэх аргуудыг нэрлэнэ үү

1. Ургийн шингэнд лецитин-сфингомиелины харьцааг
2. Ламел биетийг тоолох
3. Фосфатидилглицерин (PG)
4. Хэт авиан оношилгоо
5. Фибронектин

34 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Дутуу төрөлтийн үед умайн булчингийн агшилтыг зогсоох зорилгоор хэрэглэх Нифидепины цохилтын тунг нэрлэнэ үү?

1. 10 мг-аар 20 хормын зайтай 3 удаа
2. 20 мг-аар 20 хормын зайтай 3 удаа
3. 30 мг-аар 20 хормын затай 3 удаа
4. 30 мг-аар 1 удаа
5. 10 мг-аар 10 мин зайтай 3 удаа

35 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Ураг орчмын шингэн цагаас өмнө гарсан хүлээх төлвөлгөөтэй бол ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Үтрээний үзлэгийг 12 цагийн зайтай хийнэ
2. Биеийн халууныг 4 цагийн зайтай үзнэ
3. Цусанд цагаан эсийг 12 цаг тутамд үзнэ
4. Цусанд С уургийг өдөр бүр үзнэ
5. 37 долоо хоног хүрээгүй бол токолитик хэрэглэнэ

36 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Донорын цусанд ямар халдварыг заавал илрүүлэх вэ?

1. ХДХВ
2. Тэмбүү
3. В гепатит
4. С гепатит
5. Цитомегаловирус

37 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Цус буруу сэлбэснээс үүдэлтэй анафилаксийн дайрлагын үед хийх эмчилгээнээс хамааралтайг нэрлэнэ үү

1. Адреналин
2. Прометазин
3. Гидрокортизон
4. Амминофиллин
5. Аналгин

38. Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Лидокайныг хэсгийн мэдээ алдууладлтанд 40 мл-ээс их хэмжээтэй хэрэглэхээр бол адреналиныг ямар тунгаар нэмж өгөх вэ?

1. 2 мкг/кг
2. 5 мкг/кг
3. 6 мкг/кг
4. 8 мкг/кг
5. 10 мкг/кг

39. Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв

байх) Цулцан хурааг цэвэрүүлсэн эмэгтэйд ямар хугацаанд ХГД -ыг хэвийн байдалд хүрэхгүй бол хориокарциномын удирдамжийн дагуу хавдар судлалын төвд шилжүүлэх вэ?

1. 4 долоо хоног
2. 6 долоо хоног
3. 8 долоо хоног
4. 10 долоо хоног
5. 12 долоо хоног

40. Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

BRCA 1 нь өндгөвчний өмөн үүсэх эрсдэлийг хэдэн хувь нэмэгдүүлэх вэ?

1. 15%
2. 20%
3. 30%
4. 40%
5. 50%

41. Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Ургийн биофизик үзүүлэлтээр ургийн амьсгалын хөдөлгөөн 30 секундэд хэдэн удаа илэрвэл 2 оноо өгөх вэ?

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

42. Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Төрсний дараа дунд чөмөгний мэдрэл дарагдлын шинжтэй хамааралтай зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?

1. Удаан хугацаагаар өвдөг нугалаатай байх
2. Мак Робертсийн байрлалд удаан байлгах
3. Дүлэлтийн үед шилбэний нарийн ясанд даралт учирснаас
4. Гуяны урд дотор талын мэдрэхүй алдагдах шинж илэрнэ
5. Хүндээр бие засах мэдрэмж өөрчлөгдөх

43. Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Макроцитарный цус багадалтанд аль нь хамаарах вэ?

1. Остеомиелит г.м халдвар
2. Фолийн хүчил дутагдлын цус багадалт
3. Хар тугалганы хордлого
4. Эмийн хамааралтай
5. Хадуур эсийн цус багадалт

44. Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Ургийн шингэний бүрхүүлийг хагалсны дараа хэдэн цагийн дараа төрөх үйл ажиллагаа жигдрэхгүй бол В стрептококкийн халдвараас сэргийлж антибиотикт эмчилгээг эхлэх вэ?

1. Ургийн шингэнийг цоолсны дараа шууд
2. 4 цагийн дараа
3. 6 цагийн дараа
4. 8 цагийн дараа
5. 12 цагийн дараа

45. Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

FIGO 2018 Мизопростолын удирдамжаар мизопростолыг шингэлж уулгахтай холбоотой зөв мэдээлэлийг нэрлэнэ үү

1. 200 мкг тунг 25 мл бүлээн усанд найруулна
2. Бэлтгэсэн уусмалыг 2 цаг тутам уулгана
3. Амин үзүүлэлтүүдийг 4 цаг туамд хянаж төрөлтийн түүхэнд тэмдэглэнэ
4. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлсэн бол тунг бууруулаад төрөх хүртэл уулгаж болно
5. Хэрэв 4 тунгийн дараа төрөх үйл ажиллагаа эхлэхүй бол мизопростолыг зогсооно

46 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Эмэгтэй 14 долоо хоног БЮ ирээгүй, жирэмсний тест эерэг гарсан. Хэт авиан шинжилгээнд түүний ерөндөг нь умайн хүзүүний сувагт харагдана. Дараахийн аль нь зөв арга хэмжээ болох вэ

1. Ерөндөгийг авна
2. Ерөндөгийг авна, мөн хэвлийн хөндийг дурангаар шалгана
3. Ерөндөгийг авна, 10 өдөр Доксациклин уулгана
4. Байранд нь үлдээнэ, жирэмсний хяналтыг үргэлжлүүлнэ
5. Жирэмсэн үед ерөндөгтэй байх нь авах заалт биш

47 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Кесар мэс заслаар төрсний дараа шээс гарахгүй байхад аль нь эрсдэлт хүчин зүйл болох вэ?

1. Цус алдалт
2. Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг
3. Өмнө нь кесар мэс заслаар төрсөн
4. Мэс заслын дараах наркотик мэдээгүйжүүлэг
5. Шингэний дутагдал

48 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Хорин нэгэн настай анхан төрөгч, 41 долоо хоногтой, ураг орчмын шингэн бага тул төрөлт сэдээсэн. Төрлөгийн 2-р үед 3 цаг дүлсэн боловч ургийн толгой 0-ээс доошлохгүйгээс кесар мэс заслаар төрүүлсэн. Ургийн толгойг үтрээгээр дээш түлхэж, төвөгтэй гаргасан. Нярайн толгойд (рентген зурагт үзүүлсэн) дарагдлын хугарал үүссэн. Кесар мэс заслын ойролцоогоор хэдэн хувь нь ургийн гэмтлээр хүндэрдэг вэ?

1. 0.1%
2. 0.5%
3. 1.0%
4. 1,5%
5. 2,0%

49 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Гучин дөрвөн настай, анхны жирэмсэн, жирэмсний хяналтын үзлэгтээ ирэхэд 12 долоо хоногтой гэж тодорхойлов. Эмэгтэй төмрийн бэлдмэл агуулсан витамин ууж байснаа зогсоосон байна. Түүний цусыг шинжлэхэд гемтокрит 39% байна. Цаашид энэ эмэгтэйд төмрийн бэлдмэлийг зөвлөх үү?

1. Цус багадалтгүй тул төмрийн бэлдмэл уух шаардлагагүй
2. Төмрөөр баялаг хүнсний хэрэглээ хэвийн байгаа тул төмрийн бэлдмэл уух шаардлагагүй
3. Төмрийн бэлдмэл нэмэлтээр уухгүй бол ураг нь цус багадалтанд өртөнө
4. Жирэмсний хугацаанд төмрийн хэрэгцээгээ нөхөхийн тулд цус багадалт үүсээгүй ч төмрийн бэлдмэлийг уух шаардлагатай
5. Хэрэв гематокрит 36%-аас багасвал төмрийн бэлдмэл ууж эхлэх

50 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

28 настай анхны жирэмсэн, одоо 24 долоо хоногтой хяналтанд ирж үзүүлэхээр ирсэн. Түүний гол зовиур нь баруун талын цавь орчимд ялангуяа алхах, дасгал хийхэд өвдөх ба өвдөлт энэ үед нэмэгдэнэ.

Халуураагүй, чичрүүдэс байхгүй. Шээсэнд өөрчлөлтгүй, хэвлийн бусад хэсгээр өвдөлтгүй, өтгөн хэвийн гарна. Өвдөж буй газарт бүлээн жин тавихад өвдөлт багасна. Өвдөлтийн шалтгаан дараах жагсаалтаас аль нь хамгийн зөв байх магадлалтай вэ?

1. Дугуй холбоосны өвдөлт
2. Мухар олгойн үрэвсэл
3. Дутуу төрөлт
4. Бөөрний чулуу
5. Шээсний өгөх замын халдвар

51 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

33 настай анхны жирэмсэн, 10 долоо хоногтой хяналтын үзлэгт ирсэн. Шинжилгээнүүд хийгдсэн ба элэгний В вирусын гадаргуугийн антиген эерэг хариу гарсан. Элэгний үйл ажиллагаа хэвийн. Гепатитын В вирусын цөм антиген, гадаргуугийн антигел сөрөг хариутай гарчээ. Нярайд халдвар дамжихаас сэргийлэхийн тулд ямар зөвлөмж өгөх вэ?

1. Эхэд иммуноглобулин тарих
2. Эхэд гепатитын В вирусын вакцин тарих
3. Төрөх хугацаа болохоор кесар хагалгаагаар төрөх Нярайд гепатитын В вирусын эсрэг вакцин тарих
4. Нярайд гепатитын В вирусын эсрэг вакцин болон иммуноглобулин тарих

52 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Төрөлтийн 1-р үеийн идэвхитэй шатанд эпидураль мэдээгүйжүүлэг хийлгэхэд урагт зүрхний цохилтонд удааширсан удаашрал үүссэн бол үндсэн шалтгааныг тайлбарлана уу

1. Хүй унжих
2. Эпидурал мэдээгүйжүүлэг
3. Окситоцины эрчимжүүлэлтээс үүдэлтэй Ихсийн ховхрол
4. Умайн хэт цочрол/гиперстимуляци

53 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

36 настай эмэгтэй, жирэмслэлт 1, төрөлт 1. Төрсний дараах үзлэгтээ хамрагдахаар ирсэн. Одоогоос 6 долоо хоногийн өмнө төрөх замаар төрсөн. ЖСА-ийн арга сонгон хэрэглэх хүсэлтэй бөгөөд ямар нэгэн хавсарсан эмгэг байхгүй. Тамхи татдаггүй, ямар нэгэн эм байхгүй. Эмэгтэйд зөвлөгөөг өгөхдөө дараах аргуудын аль хөхний сүү үүсэлтийг бууруулдаг гэж тайлбарлах вэ?

- A. Умайн ерөндөг
- B. Зөвхөн прогестрон агуулсан шахмал
- C. Депомедроксинпрогестрон ацетат
- D. Хавсарсан дааврын бэлдмэл
- E. Бэлгэвч, спермецидын хөөс

54 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

71 настай эмэгтэй, жирэмслэлт 2, төрөлт 2, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орохоор ирсэн. Сүүлийн 10 жилд эмчид үзүүлээгүй, Пап тест өчигдөр өгөөд хэвийн гарсан, ямар нэгэн эм хэрэглэдэггүй. 1 удаа гэрлэсэн, тамхи татдаггүй, архи спиртыг маш ховор хэрэглэдэг, АД 140/70 мм муб. Жин 76 кг, өндөр 160 см. Дараах урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнүүдээс алийг нь зөвлөх вэ?

1. Пап тест, маммограм
2. Пап тест, маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран
3. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ
4. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, туберкулины тест
5. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, туберкулины сорил, сонсголын шинжилгээ

55 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

45 настай эмэгтэй жирэмслэлт 1, төрөлт 1, хөхний карцинома оношлогдсон. Дараах зүйлээс аль нь хавдрын эмчилгээний прогнозад хамгийн чухал байдаг вэ?

1. Оношлогдсон нас
2. Хавдрын хэмжээ
3. Суганы булчирхайд үсэрхийлсэн эсэх
4. Эстрогений рецептортэй эсийн хадвар
5. Прогестрон рецептортой эсийн хадвар

56 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Дараахаас ахондроплази өвчний онцлогийг аль нь илтгэж байна вэ?

1. Аутосомийн рецессив байдлаар удамшдаг
2. Нийт тохиолдлуудаас 50%-ийн шинэ мутаци эзэлдэг
3. Кесар хагалгаа цөөхөн тохиолддог
4. Өвчтэй бол нөхөн үржихүйн нас хүртлээ амьдрах нь ховор
5. Нурууны гажиг нь хүйн дарагдалд нөлөөлдөг

57 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Аорт аль нугаламын түвшинд ташааны ерөнхий 2
артери болж салаалдаг вэ?

1. Сээрний 12-р нугаламын түвшинд
2. Бүсэлхийн 2-р нугаламын түвшинд
3. Бүсэлхийн 4-р нугаламын түвшинд
4. Ууцны 1-р нугаламын түвшинд

58 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Бернерийн хавдар өндгөвчийн хавдрын ямар
ангилалд хамаарах вэ?

1. Үр хөврөлийн гаралтай
2. Бэлгийн татлагын
3. Тулгуурын
4. Хучуурын гаралтай
5. Даавар хамааралтай

59 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Нөхөн Үржихүйн технологийн аль нь ургийн гаж хөгжил үүсгэх эрсдэл илүү вэ?

1. Хөлдөөсөн үр хөврөл шилжүүлэн суулгах
2. Өндгөвчийг хориальный гонадотропин релизинг дааврын аганистоор сэдээсэн
3. Өндгөвчийг хориальны гонадотропин релизинг дааврын антогонистоор сэдээсэн
4. Хуруу шилэнд үр тогтоосон
5. Цитоплазмд эр бэлгийн эс тарьсан

60 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Марсупиализаци мэс ажилбарын зорилго нь юу вэ?

1. Хурсан шингэн, идээрийг гаргах
2. Бартолин булчирхайд цорго шинээр үүсгэх
3. Бартолин булчирхайг авах
4. Бартолин булчирхайг үлдээх
5. Бартолин булчирхайг буглааны гэрийн хамт авах

61 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Ургийн халдварын тархалтын үнэн зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. ХДХВ -ийн халдвар эхээс урагт дамжих эрсдэл 15-20%
2. Парвовирусын халдвар жирэмсэн үед ойролцоогоор 3% тохиолдох ба урагт цус багадлт үүсгэнэ
3. В вирусийн гепатитийн урьдчилан сэргийлэлт хийхгүй бол урагт халдвар дамжих эрсдэл 50%
4. Цус задлагч стрептококк нь урагт хүнд хэлбэрийн халдвар үүсгэнэ
5. Токсоплазмын халдвар жирэмсний 3 дах 3 сард урагт халдвар дамжих эрсдэл 15%

62 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Биений юмны өмнөх хам шинжийн үед аль эмчилгээний аргыг сонгох вэ?

1. Тайвшруулах эмчилгээ
2. Жирэмснээс хамгаалах хавсарсан дааврын бэлдмэл
3. Витамин B6
4. Флуоксатин (SSRI)
5. Давс хязгаарлах

1. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв
2. 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв
3. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв
4. Зөвхөн 4-р хариулт зөв
5. Бүх хариулт зөв

63 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Прогестин хэрэглэхэд ургийн ямар гаж хөгжил үүсэх эрсдэлтэй вэ?

1. Хондрадисплази
2. Мэдрэлийн тогтолцооны гажиг
3. Хуруугүй төрөх
4. Гипоспади Сэтэрхий уруул

64 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Цусанд Альфафетопротейн багасах нь урагт ямар эмгэг байгааг илтгэх вэ?

1. Омфалоцеле
2. Ананцефали
3. Ихэс ховхролт
4. Трисоми
5. Ураг амьгүй болох эрсдэлтэй

65 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Эндометриозын эмчилгээ 2 сар хийлгэсэн, нүүр халуу оргиж, үтрээ хуурайших, шинж илэрсэн. Дараах эмүүдийн аль нь ийм байдал үүсгэх вэ?

1. Андрогены бэлдмэл
2. Гонадотропины релизинг дааврын агонист
3. Жирэмслэхээс хамгаалах дааврын хавсарсан бэлдмэл
4. Прогестаген
5. Стероид бус үрэвслийн эм

66 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Даавар орлуулах эмчилгээ хийж болох тохиолдлыг нэрлэнэ үү?

1. АД ихсэлт
2. Альцгеймерийн эмгэг
3. Элэгний хурц үрэвсэл
4. Гэр бүлийн гиперлипидеми
5. Хөхний хавдрын улмаас хөхөө авхуулсан

67 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

БЮМ –ийн 24 дэх хоногт умайн хүзүүний салиа 10-12 см сунах нь юуг илтгэх вэ?

1. Өндгөн эс гадагшлалтгүй мөчлөг
2. Гиперандрогени
3. БЮМ –ын 2 шат богиноссон
4. БЮМ –ийн 1 шат богиноссон
5. Хэвийн БЮМ байгааг

68 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Ургийн хромосомын эмгэгийн оношилгоонд алийг өргөн ашигладаг вэ

1. Хоёрлол тест
2. Цэлмэнгийн биопси
3. Ургийн шилний арын зайн зузаан хэмжилт (NT)
4. Амниоцентез
5. Гурвал тест

1. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв
2. 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв
3. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв
4. Зөвхөн 4-р хариулт зөв
5. Бүх хариулт зөв

69 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Гонадотропины ялгаралтыг идэвхижүүлэх бэлдмэл?

1. Летрозол
2. Синестрол
3. Этинилэстрадиол
4. Тамоксифен
5. Клостильбегит

70 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Киари- Фромеллийн хамшинжийн үед илрэх эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?

1. Умай жижигрэх
2. Биений юмгүйдэл
3. Пролактин ихсэх
4. Үсжих
5. Өндгөвч томрох

71 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Хэт авиан шинжилгээнд ихэс зузаан бол ямар эмгэгийг сэжиглэх вэ?

1. Тамхи таталт
2. Чихрийн шижин
3. Гаж хөгжил
4. Тэмбүү
5. ХДХВ-ийн халдвар

72 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Жирэмсний эхний 3 сартайд ургийн NT зузаарал юутай хамааралгүй вэ

1. Дауны хамшинж
2. Ургийн өсөлт саарах хамшинж
3. Птаугийн хамшинж
4. Манас таталтын урьдал
5. Эдвардсын хамшинж

73 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

"Эмнэлгийн мэргэжилтэн" тодорхойлолтыг сонгоно уу

1

Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

2

Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, уламжлалтын их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

3

Хүний их, бага эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

4

Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

5

Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

72 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Хучуурын гаралтай хавдрын хяналтанд аль маркеруудыг ашиглах вэ?

1. HE4
2. CA125
3. CEA
4. CA 19.9
5. AFP

75 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Яаралтай жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудыг нэрлэнэ үү?

1. Левоноргестрол
2. ДХЭ
3. Зэс агуулсан ерөндөг
4. Улипристал ацетат
5. Үтрээ угаах

76 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Хэт авиан Допплер шинжилгээний индексүүдийг нэрлэнэ үү

1. Агшилтын дээд хурд
2. Эсэргүүцлийн индекс
3. Тархи ихсийн харьцаа
4. Лупшилтын индекс
5. Сулралын муруй

77 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Том жинтэй хүүхэд төрүүлж байсан, жирэмсэн эмэгтэйд глюкозын ачаалалтай сорилоор өлөн үеийн сахар 5.4 ммоль/л, 1 цагийн дараа 12.5 ммоль/л, 2 цагийн дараа 8.4 ммоль/л бол юу гэж тайлбарлах вэ?

1. Хэвийн
2. Чихрийн шижин илэрсэн
3. Сорил өөрчлөлттэй
4. Сорилыг давтан хийх
5. Сорилыг инсулин 7 хоног хэрэглсэний дараа давтан хийх

78 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Төрсний дараа мэдрэл саажилт үүсэх шалтгаан,
илрэх шинжийн зөвийг нэрлэнэ үү

1. Төрөлтийн үед удаан хугацаагаар өвдөг нугалаатай байх
2. Шилбэний нарийн ясны толгойд даралт учирсанаас
3. Дүлэх үед гарын алганд даралт учирсанаас
4. Мак Робертсийн байрлалын үед
5. Хэвлий дээр дарах үед

79 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Гүнийн венийн тромбозыг илрүүлэхийн тулд цуврал даралтат хэт авиан шинжилгээг хэд дэх өдрүүдэд үзэх хэрэгтэй вэ?

1. Өдөр бүх хянаж үзнэ
2. 2, 4 дэх өдөр
3. 3, 7 дах өдөр
4. 4, 8 дах хоног
5. 10 хоногт 1 удаа

80 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Аденокарцинома үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү

1. Эстрогений илүүдэл
2. Таргалалт
3. Чихрийн шижин
4. Артерийн даралт ихдэх өвчин
5. Өндгөвч уйланхайжих хамшинж

81 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Харааны товгороос дараах дааврууд ялгарна:

1. Рилизинг- даавар
2. Станины даавар
3. Вазопресин
4. Окситоцин
5. Мелатонин

82 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Дараах эмүүдээс аль нь жирэмсний 2-р хагасаас хойш УОШ-ийг багасгах үйлчилгээ үзүүлэх вэ?

1. Гидролазин
2. Ветаблокатор
3. Кальцийн сувгийг саатуулагч
4. Ангиотензин сувгийн саатуулагч
5. Карбомезапин

83 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Аденомиозыг тархалтын ангиллын II зэрэгт хамаарахыг сонгоно уу?

1. Умайн их биеийн зөвхөн салстад эмгэг өөрчлөлт байрших
2. Умайн булчинт давхаргын 1/3-ийг хамарсан байх
3. Умайн булчинт давхаргын талыг хамарсан байх
4. Эмгэг процесс умайн бүх ханыг хамарсан байх
5. Эмгэг процесс умайн хананаас хальж, хэвлийн гялтан, зэргэлдээх эрхтэнд үүссэн байх

84 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Э., 24 настай, жирэмсний 17 долоо хоногтой. Цусны сийвэнд АФП-ны түвшин 6.0 MOM бол дараагийн шатанд эхлээд авах авах арга хэмжээг нэрлэнэ үү?

1. АФП-ыг давтан хэмжих
2. Хэт авиан шинжилгээ
3. Амниоцентез
4. Амниографи
5. Жирэмснийг таслахыг зөвлөнө

85 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Жирэмсний төгсгөлд үтрээний цитологи шинжилгээнд ямар эс давамгайлах вэ?

1. Гадаргуугийн эс
2. Завсрын эс
3. Суурь эс
4. Суурийн хажуугийн эс
5. Суурь ба суурийн хажуугийн эс

86 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Хэвлийн урд хананы өнгөц судасжилтанд аль судас оролцох вэ?

1. epigastrica superior
2. Superficial circumflex artery
3. epigastrica inferior
4. illiaca circumflex

87 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Умайн ёроолын тунгалагийн урсгал нь аль зангилаанд цутгах вэ?

1. Ташааны гадна зангилаанд
2. Ташааны дотор тунгалагийн зангилаанд
3. Цавины өнгөц тунгалагийн зангилаанд
4. Гол судасны зангилаанд
5. Давсаг орчмын зангилаанд

88 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Аль нь илүү тээлт үүсгэхэд хамааралтай вэ?

1. Менингомиелоцеле
2. Нугасны эвэрхий
3. Тархигүй ураг
4. Омфалоцеле
5. Тернерийн хам шинж

89 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Өмнө нь дутуу төрж байсан эмэгтэйд, дахин дутуу төрөхөөс сэргийлж дараах эмчилгээнээс алийг нь хийх вэ?

1. Жирэмсний 32 долоо хоног хүртэл токолитик бага тунгаар хэрэглэнэ.
2. Дутуу төрөхийг завдаж байгаа үед Магне В6 жирэмсний туршид хэрэглэнэ.
3. Зовуургүй бол хяналт тавьж ажиглана.
4. Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнө 17α гидроксипрогестерон 250 мг – аар, булчинд, 7 хоног тутамд тарина.
5. Умай тонустай үед, 17 α гидроксипрогестерон өдөрт 1 удаа, 7 хоног хэрэглэнэ.

90 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Өндгөвчийн эрт цуцах (эрт дутагдах) хамшинж үүсэхэд хүргэх шалтгаан нь:

1. Удамшлын шалтгаан
2. Нөхөн үржихүйн насанд фолликулын сөнөрөл хэт идэвхитэй явагдах
3. Туяаны үйлчлэл
4. Улаануудын халдвар
5. Х хромосомын дутагдал

91 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

В вирусын гепатиттай холбоотой зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?

1. Босоо замаар халдвар дамжих эрсдэл ихсээр дамжихаас бага
2. HbeAg эсрэг төрөгч илрэх нь халдварын далд үе шатыг илэрхийлнэ
3. В вирусын гепатит жирэмсний эхний 3 сард үүсвэл ургийн гаж хөгжил үүсгэнэ
4. Вирусын ачаалал өндөр бол 28 долоо хоногтойгоос вирусын эсрэг эм хэрэглэнэ
5. Халдвартай эхээс төрсөн нярайд 12 сарын дараа шинжилгээ хийнэ.

90 Олон сонголттой тест (Хэдэн ч хариулт зөв байж болох)

Жирэмсэн үед гепатит С-тэй хамааралтай зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?

1. HIV-тай хавсрах нь эхээс урагт халдах эрсдэл нэмэгдэнэ.
2. Жирэмсэн үед интерферон хэрэглэх нь эсрэг заалттай
3. Жирэмсэн үед С гепатитын хурц хэлбэр ховор тохиолдоно.
4. Эхээс урагт халдах эрсдэл 3-5%
5. Вирусын ачаалал $>2.5 \times 10^6$ copies/ml DNA бол өндөр гэж үзнэ

93 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Креатинин хэд байх нь үжлийг үнэлэх SOFA үнэлгээгээр 3 оноо өгөх вэ?

- 1) $<1.2 - 1.9$ мг/дл
- 2) $2.0 - 3.4$ мг/дл
- 3) $3.5 - 4.9$ мг/дл
- 4) $5.0 - 5.5$ мг/дл
- 5) >6.0 мг/дл

94 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Жирэмсний 32 долоо хоногтой. Хэт авиан шинжилгээнд УОШ-ний эзлэхүүн 32 см бол дараахаас аль нь байж болох вэ?

1. Ургийн 12 нугалаа гэдэсний битүүрэл
2. Ургийн бөөрний эмгэг
3. Резус мэдрэгшил үүссэн
4. HELLP хамшинж
5. Тромбоцитопенийн пурпура

95 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Анти D эсрэгбие үүсээгүй бол иммуноглобулинг урьдчилан сэргийлэх ямар тунгаар хэрэглэх вэ?

- a. 150
- b. 200
- c. 250
- d. 300
- e. 350

Үйл ажиллагааны ямар сорилууд эстроген дааврын ханалтыг тодруулдаг вэ?

1. Хүүхэн харааны шинж
2. Кариопикнетик индекс
3. Оймын навчны шинж
4. Суурин халууны шинж
5. Кольпоцитологи

Умайн хүзүүний цагаарал нь:

1. Ихэвчлэн 30-35 насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно
2. Олон үет хучуурын эсүүд эвэршин зузаарах
3. Гадаргуугийн үенүүд нь нимгэрч суурин эсүүд зузаарна
4. Доод талын эдүүдтэйгээ нягт наалдана
5. Богино хугацаанд өмөнд шилжинэ

Ёс зүйн хүрээнд эмнэлгийн мэргэжилтэн
үйлчлүүлэгчдэд ямар ямар тохиолдолд шууд нөлөө
үзүүлэх ёсгүй бэ?

1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахад нь
2. Харьяалал харгалзахгүй үйлчлүүлэхэд нь
3. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах байгууллага,
эмчээ сонгоход эрхээ эдлэхэд нь
4. Эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд нь
5. Шилжин суурьшихад нь

Элгэн доторхи цөс зогсонгшил нь ямар хүндрэл үүсгэх вэ?

1. Гэдэс зунгаагаар түгжрэх
2. Ураг амьгүй болох
3. Дутуу төрөх
4. Ургийн халдвар
5. Ургийн өсөлтийн саатал


100 Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх)

Эмэгтэй Н., 32 настай, 3 дах төрөлт, жирэмсний 32 долоо хоногтой. Ургийн жин байх ёстой хэмжээнээс бага, эмэгтэй өдөрт нэг хайрцаг тамхи татдаг. Дараах шинжилгээний алийг нь хийх шаардлагатай вэ?

- 1) Эстриол
- 2) Прогестерон
- 3) Пролактин
- 4) Андроген
- 5) ХГ

1. Жирэмслэхээс өмнө фолийн хүчил ууснаар урагт мэдрэлийн гуурсны гаж хөгжил үүсэх эрсдэлийг хэдэн хувь бууруулах вэ?
 - A. 11%
 - B. 26%
 - C. 50%
 - D. 72%
 - E. 90%
2. Дэлхийд хамгийн түгээмэл тохиолдох нэг генийн эмгэгт аль нь хамаарах вэ?
 - A. Гемоглобинопати
 - B. Гликоген нөөцлөгдөх өвчин
 - C. Фенилкетонури мутаци
 - D. Уйланхайт фиброз
 - E. Дюшены булчингийн дистрофи
3. Жирэмсний аль хугацаанаас агаарын тээврээр зорчихыг зөвлөдөггүй вэ?
 - A. 26 долоо хоног
 - B. 28 долоо хоног
 - C. 30 долоо хоног
 - D. 32 долоо хоног
 - E. 36 долоо хоног
4. Жирэмсэн үед Кортикотропийн сэдээгч дааврын анхдагч эх үүсвэр аль нь болохыг нэрлэнэ үү

- A. Ихэс
 - B. Ургийн бөөрний дээд булчирхай
 - C. Ургийн харааны товгор
 - D. Эхийн харааны товгор
 - E. Хорион бүрхүүл
5. Дауны хамшинжийг илрүүлэхэд жирэмсний 19-24 долоо хоногтойд ургийн дагзны арьсны зузаан(NF)-ы босго хэмжээ зурагт харуулсан цагаан тэмдэгтээр хэд бол эерэг гэж үзэх вэ?



- A. ≥ 6 мм
 - B. ≥ 7 мм
 - C. ≥ 8 мм
 - D. ≥ 9 мм
 - E. ≥ 10 мм
6. Mirror буюу толин тусгал хамшинжид дараахаас аль нь хамаарах вэ?
- 1. Эхийн хаван
 - 2. Артерийн даралт ихсэлт
 - 3. Шээсээр уураг алдах
 - 4. Ургийн гидропс
 - 5. Элэгний трансаминаз ихсэх
7. Ургийн тахиаритми гэдэг нь ургийн зүрхний цохилт 1 минутанд 180-200 удаа болохыг хэлнэ. Ямар шалтгаанаас үүсэх вэ?
- 1. Бамбайн дутагдал
 - 2. Ургийн халдвар
 - 3. Манас таталтын урьдлын хүнд хэлбэр
 - 4. Ургийн цус багадалт
 - 5. 28 долоо хоног хүртэл урагт илэрч болно
8. Ургийн уушгины хөгжлийг үнэлэх аргуудыг нэрлэнэ үү
- 1. Ургийн шингэнд лецитин-сфингомиелины харьцаагаар
 - 2. Ламел биетийг тоолох
 - 3. Фосфатидилглицерин (PG)
 - 4. Хэт авиан оношилгоо
 - 5. Фибронектин
9. Дутуу төрөлтийн үед умайн булчингийн агшилтыг зогсоох зорилгоор хэрэглэх Нифидепины цохилтын тунг нэрлэнэ үү?
- A. 10 мг-аар 20 хормын зайтай 3 удаа
 - B. 20 мг-аар 20 хормын зайтай 3 удаа
 - C. 30 мг-аар 20 хормын зайтай 3 удаа*
 - D. 30 мг-аар 1 удаа
 - E. 10 мг-аар 10 мин зайтай 3 удаа
10. Ураг орчмын шингэн цагаас өмнө гарсан үед хүлээх төлөвлөгөөтэй бол ямар арга хэмжээ авах вэ?
- 1. Үтрээний үзлэгийг 12 цагийн зайтай хийнэ

2. Биеийн халууныг 4 цагийн зайтай үзнэ
 3. Цусанд цагаан эсийг 12 цаг тутамд үзнэ
 4. Цусанд С уургийг өдөр бүр үзнэ
 5. 37 долоо хоног хүрээгүй бол токолитик хэрэглэнэ
11. Донорын цусанд ямар халдварыг заавал илрүүлэх вэ?
1. ХДХВ
 2. Тэмбүү
 3. В гепатит
 4. С гепатит
 5. Цитомегаловирус
12. Цус буруу сэлбэснээс үүдэлтэй анафилаксийн дайрлагын үед хийх эмчилгээнээс хамааралтайг нэрлэнэ үү
1. Адреналин
 2. Прометазин
 3. Гидрокортизон
 4. Амминофиллин
 5. Аналгин
13. Лидокайныг хэсгийн мэдээ алдуулалтанд 40 мл-ээс их хэмжээтэй хэрэглэхээр бол адреналиныг ямар тунгаар нэмж өгөх вэ?
- A. 2 мкг/кг
 - B. 5 мкг/кг
 - C. 6 мкг/кг
 - D. 8 мкг/кг
 - E. 10 мкг/кг
14. Цулцан хураа оношоор умайн хөндийг цэвэрлүүлсэн эмэгтэйд ямар хугацаанд ХГ хэвийн байдалд хүрэхгүй бол хориокарциномын удирдамжийн дагуу хавдар судлалын төвд шилжүүлэх вэ?
- A. 4 долоо хоног
 - B. 6 долоо хоног
 - C. 8 долоо хоног
 - D. 10 долоо хоног
 - E. 12 долоо хоног
15. BRCA 1 нь өндгөвчний өмөн үүсэх эрсдэлийг хэдэн хувь нэмэгдүүлэх вэ?
- A. 15%
 - B. 20%
 - C. 30%
 - D. 40%
 - E. 50%
16. Ургийн биофизик үзүүлэлтээр ургийн амьсгалын хөдөлгөөн 30 секундэд хэдэн удаа илэрвэл 2 оноо өгөх вэ?
- A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
 - E. 4
17. Төрсний дараа дунд чөмөгний мэдрэл дарагдлын шинжтэй хамааралтай зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?
1. Удаан хугацаагаар өвдөг нугалаатай байх
 2. Мак Робертсийн байрлалд удаан байлгах
 3. Дүлэлтийн үед шилбэний нарийн ясанд даралт учирснаас
 4. Гуяны урд дотор талын мэдрэхүй алдагдах шинж илэрнэ
 5. Хүндээр бие засах мэдрэмж өөрчлөгдөх

18. Макроцитарны цус багадалтанд аль нь хамаарах вэ?

1. Остеомиелит г.м халдвар
2. Фолийн хүчил дутагдлын цус багадалт
3. Хар тугалганы хордлого
4. Эмийн хамааралтай
5. Хадуур эсийн цус багадалт

19. Ургийн шингэний бүрхүүлийг хагалсны дараа хэдэн цагийн дараа төрөх үйл ажиллагаа жигдрэхгүй бол В стрептококкийн халдвараас сэргийлж антибиотикт эмчилгээг эхлэх вэ?

- A. Ургийн шингэнийг цоолсны дараа шууд
- B. 4 цагийн дараа
- C. 6 цагийн дараа
- D. 8 цагийн дараа
- E. 12 цагийн дараа

20. FIGO 2018 Мизопростолын удирдамжаар мизопростолыг шингэлж уулгахтай холбоотой зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. 200 мкг тунг 25 мл бүлээн усанд найруулна
2. Бэлтгэсэн уусмалыг 2 цаг тутам уулгана
3. Амин үзүүлэлтүүдийг 4 цаг тутамд хянаж төрөлтийн түүхэнд тэмдэглэнэ
4. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлсэн бол тунг бууруулаад төрөх хүртэл уулгаж болно
5. Хэрэв 4 тунгийн дараа төрөх үйл ажиллагаа эхлэхгүй бол мизопростолыг зогсооно

21. Эмэгтэй 14 долоо хоног БЮ ирээгүй, жирэмсний тест эерэг гарсан. Хэт авиан шинжилгээнд түүний ерөндөг нь умайн хүзүүний сувагт харагдана. Дараахийн аль нь зөв арга хэмжээ болох вэ

- A. Ерөндөгийг авна
- B. Ерөндөгийг авна, мөн хэвлийн хөндийг дурангаар шалгана
- C. Ерөндөгийг авна, 10 өдөр Доксациклин уулгана
- D. Байранд нь үлдээнэ, жирэмсний хяналтыг үргэлжлүүлнэ
- E. Жирэмсэн үед ерөндөгтэй байх нь авах заалт биш

22. Кесар мэс заслаар төрсний дараа шээс гарахгүй байхад аль нь эрсдэлт хүчин зүйл болох вэ?

1. Цус алдалт
2. Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг
3. Өмнө нь кесар мэс заслаар төрсөн
4. Мэс заслын дараах наркотик мэдээгүйжүүлэг
5. Шингэний дутагдал

23. Хорин нэгэн настай анхан төрөгч, 41 долоо хоногтой, ураг орчмын шингэн бага тул төрөлт сэдээсэн. Төрлөгийн 2-р үед 3 цаг дүлсэн боловч ургийн толгой 0-ээс доошлохгүйн улмаас кесар мэс заслаар төрүүлсэн. Ургийн толгойг үтрээгээр дээш түлхэж, төвөгтэй гаргасан. Нярайн толгойд дарагдлын хугарал үүссэн. Кесар мэс заслын ойролцоогоор хэдэн хувь нь ургийн гэмтлээр хүндэрдэг вэ?

- A. 0.1%
- B. 0.5%
- C. 1.0%
- D. 1.5%
- E. 2.0%

24. Гучин дөрвөн настай, анхны жирэмсэн, жирэмсний хяналтын үзлэгт ирэхэд 12 долоо хоногтой гэж тодорхойлов. Эмэгтэй төмрийн бэлдмэл агуулсан витамин ууж байснаа зогсоосон байна. Түүний цусыг шинжлэхэд гемтокрит 39% байна. Цаашид энэ эмэгтэйд төмрийн бэлдмэлийг зөвлөх үү?

- A. Цус багадалтгүй тул төмрийн бэлдмэл уух шаардлагагүй
- B. Төмрөөр баялаг хүнсний хэрэглээ хэвийн байгаа тул төмрийн бэлдмэл уух шаардлагагүй

- С. Төмрийн бэлдмэл нэмэлтээр уухгүй бол ураг нь цус багадалтанд өртөнө
- Д. Жирэмсний хугацаанд төмрийн хэрэгцээгээ нөхөхийн тулд цус багадалт үүсээгүй ч төмрийн бэлдмэлийг уух шаардлагатай
- Е. Хэрэв гематокрит 36%-аас багасвал төмрийн бэлдмэл ууж эхлэх

25. 28 настай анхны жирэмсэн, одоо 24 долоо хоногтой хяналтанд ирж үзүүлэхээр ирсэн. Түүний гол зовиур нь баруун талын цавь орчимд ялангуяа алхах, дасгал хийхэд өвдөх ба өвдөлт энэ үед нэмэгдэнэ. Халуураагүй, чичрүүдэс байхгүй. Шээсэнд өөрчлөлтгүй, хэвлийн бусад хэсгээр өвдөлтгүй, өтгөн хэвийн гарна. Өвдөж буй газарт бүлээн жин тавихад өвдөлт багасна. Өвдөлтийн шалтгаан дараах жагсаалтаас аль нь хамгийн зөв байх магадлалтай вэ?

- А. Дугуй холбоосны өвдөлт
- В. Мухар олгойн үрэвсэл
- С. Дутуу төрөлт
- Д. Бөөрний чулуу
- Е. Шээсний өгөх замын халдвар

26. 33 настай анхны жирэмсэн, 10 долоо хоногтой хяналтын үзлэгт ирсэн. Шинжилгээнүүд хийгдсэн ба элэгний В вирусын гадаргуугын антиген эерэг гарсан. Элэгний үйл ажиллагаа хэвийн. Гепатитын В вирусын цөм антиген, гадаргуугын антители сөрөг хариутай гарчээ. Нярайд халдвар дамжихаас сэргийлэхийн тулд ямар зөвлөмж өгөх вэ?

- А. Эхэд иммуноглобулин тарих
- В. Эхэд гепатитын В вирусын вакцин тарих
- С. Төрөх хугацаа болохоор кесар хагалгаагаар төрөх
- Д. Нярайд гепатитын В вирусын эсрэг вакцин тарих
- Е. Нярайд гепатитын В вирусын эсрэг вакцин болон иммуноглобулин тарих

27. Төрөлтийн 1-р үеийн идэвхитэй шатанд эпидураль мэдээгүйжүүлэг хийлгэхэд урагт зүрхний цохилтонд удааширсан удаашрал үүссэн бол үндсэн шалтгааныг тайлбарлана уу

- А. Хүй унжих
- В. Эпидурал мэдээгүйжүүлэг
- С. Окситоцины эрчимжүүлэлтээс үүдэлтэй
- Д. Ихсийн ховхрол
- Е. Умайн хэт цочрол/гиперстимуляци

28. 36 настай эмэгтэй, жирэмслэлт 1, төрөлт 1. Төрсний дараах үзлэгтээ хамрагдахаар ирсэн. Одоогоос 6 долоо хоногийн өмнө төрөх замаар төрсөн. ЖСА-аас сонгон хэрэглэх хүсэлтэй бөгөөд ямар нэгэн хавсарсан эмгэг байхгүй. Тамхи татдаггүй, ямар нэгэн эм байхгүй. Эмэгтэйд зөвлөгөөг өгөхдөө дараах аргуудын аль хөхний сүү үүсэлтийг бууруулдаг гэж тайлбарлах вэ?

- А. Умайн ерөндөг
- В. Зөвхөн прогестрон агуулсан шахмал
- С. Депомедроксинпрогестрон ацетат
- Д. Хавсарсан дааврын бэлдмэл
- Е. Бэлгэвч, спермецидын хөөс

29. 71 настай эмэгтэй, жирэмслэлт 2, төрөлт 2, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орохоор ирсэн. Сүүлийн 10 жилд эмчид үзүүлээгүй, умайн хүзүүний цитологи шинжилгээ өчигдөр өгөөд хэвийн гарсан, ямар нэгэн эм хэрэглэдэггүй. 1 удаа гэрлэсэн, тамхи татдаггүй, архи дарсыг маш ховор хэрэглэдэг, АД 140/70 мм муб. Жин 76 кг, өндөр 160 см. Дараах урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнүүдээс алийг нь зөвлөх вэ?

- А. Пап тест, маммограм
- В. Пап тест, маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран
- С. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ
- Д. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, туберкулины тест
- Е. Маммограм, бүдүүн гэдэсний дуран, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, туберкулины сорил, сонсголын шинжилгээ

30. 45 настай эмэгтэй. жирэмслэлт 1, төрөлт 1, хөхний карцинома оношлогдсон. Дараах зүйлээс аль нь хавдрын эмчилгээний прогнозад хамгийн чухал байдаг вэ?

- A. Оношлогдсон нас
- B. Хавдрын хэмжээ
- C. Суганы булчирхайд үсэрхийлсэн эсэх
- D. Эстрогений рецептортэй эсийн хавдар
- E. Прогестрон рецептортой эсийн хавдар

СОРИЛЫН ТӨРӨЛ БА ХАРИУЛАХ ЗААВАР

- **А хэлбэрийн нэг сонголттой сорил.** Энэ хэлбэрийн сорилын сонголт нь A, B, C, D, E гэсэн үсгэн дугаартай байх ба хамгийн зөв нэг хариултыг сонгож, хариултын дугаарын үсгийг шууд тэмдэглэнэ.

А ХЭЛБЭРИЙН НЭГ СОНГОЛТТОЙ СОРИЛ.

1. Дараах шинжилгээнүүдээс аль нь хүнд хэлбэрийн үжил байгааг илэрхийлэх вэ?
 - A. CRP 160 мг/л
 - B. D-Dimer 1600 нг/мл
 - C. ESR 90 мм/цаг
 - D. Лактат артерийн цусанд 6 ммоль/л
 - E. WBC 16×10^9 /л
2. Хоёр фазын дефибрилятораар хэдэн Дж-оор цохиулах вэ?
 - A. 150 Дж
 - B. 200 Дж
 - C. 250 Дж
 - D. 300 Дж
 - E. 360 Дж
3. Креатинин хэд байх нь үжлийг үнэлэх SOFA үнэлгээгээр 3 оноо өгөх вэ?
 - A. <1.2 -1.9 мг/дл
 - B. 2.0-3.4 мг/дл
 - C. 3.5-4.9 мг/дл
 - D. 5.0-5.5 мг/дл
 - E. >6.0 мг/дл
4. 70 кг жинтэй эмэгтэй төрөх үедээ 2100 мл цус алдсан бол эргэлдэх цусныхаа хэдэн хувийг алдсан гэж тооцох вэ?
 - A. >25%
 - B. >30%
 - C. >35%
 - D. >40%
 - E. >50%
5. Төрсний дараах цус алдалтын үед окситоцины 20 нэгжтэй шингэнийг хэдэн литрээс хэтрүүлж болохгүй вэ?
 - A. 1 л

- B. 1.5л
- C. 2 л
- D. 2.5 л
- E. 3 л

6. Цусанд магнийн түвшин хэд хүрэхэд амьсгалын тоо цөөрөх вэ?
- A. 6 mEq/l
 - B. 8 mEq/l
 - C. 10 mEq/l
 - D. 12 mEq/l
 - E. >14 mEq/l
7. Гүнийн венийн тромбозыг илрүүлэхийн тулд цуврал даралтат хэт авиан шинжилгээг хэд дэх өдрүүдэд үзэх хэрэгтэй вэ?
- A. Өдөр бүх хянаж үзнэ
 - B. 2, 4 дэх өдөр
 - C. 3, 7 дах өдөр
 - D. 4, 8 дах хоног
 - E. 10 хоногт 1 удаа
8. Доорхоос аль нь өндгөвчийн гаралтай андроген ихсэлт үүсгэх вэ?
- A. Андростендион
 - B. ДГЭА
 - C. ДГЭАС
 - D. 17 гидроксипрогестерон
 - E. Ерөнхий тестостерон
9. Том жинтэй хүүхэд төрүүлж байсан, жирэмсэн эмэгтэйд глюкозын ачаалалтай сорилоор өлөн үеийн сахар 5.4 ммоль/л, 1 цагийн дараа 12.5 ммоль/л, 2 цагийн дараа 8.4 ммоль/л бол юу гэж тайлбарлах вэ?
- A. Хэвийн
 - B. Чихрийн шижин илэрсэн
 - C. Сорил өөрчлөлттэй
 - D. Сорилыг давтан хийх
 - E. Сорилыг инсулин 7 хоног хэрэглэсэний дараа давтан хийх
10. Даавар орлуулах эмчилгээ хийж болох тохиолдлыг нэрлэнэ үү?
- A. АД ихсэлт
 - B. Альцгеймерийн эмгэг
 - C. Элэгний хурц үрэвсэл
 - D. Гэр бүлийн гиперлипидеми
 - E. Хөхний хавдрын улмаас хөхөө авхуулсан
11. Эмэгтэй Н., 32 настай, 3 дах төрөлт, жирэмсний 32 долоо хоногтой. Ургийн жин байх ёстой хэмжээнээс бага, эмэгтэй өдөрт нэг хайрцаг тамхи татдаг. Дараах шинжилгээний алийг нь хийх шаардлагатай вэ?
- A. Эстриол
 - B. Прогестерон
 - C. Пролактин
 - D. Андроген

Е. ХГ

12. Хорионбиопсийн шинжилгээг жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд хийх вэ? А. 9-11
В. 11-13
С. 13-15
D. 15-16
E. 16-22 А
13. Үр хөврөлийн гаднах эрхтэнд аль нь хамааралгүй вэ?
А. Хорион
В. Умай
С. Шар хүүдий
D. Аллантаис
E. Ургийн бүрхүүл хальс
14. Өмнө нь дутуу төрж байсан эмэгтэйд дахин дутуу төрөхөөс сэргийлж дараах эмчилгээнээс алийг нь хийх вэ?
А. Жирэмсний 32 долоо хоног хүртэл токолитик бага тунгаар хэрэглэнэ.
В. Дутуу төрөхийг завдаж байгаа үед Магне В6 жирэмсний туршид хэрэглэнэ.
С. Зовуургүй бол хяналт тавьж ажиглана.
D. Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнө 17α гидроксипрогестерон 250 мг – аар, булчинд, 7 хоног тутамд тарина.
E. Умай тонустай үед, 17 α гидроксипрогестерон өдөрт 1 удаа, 7 хоног хэрэглэнэ.
15. Алинаас бусад нь эндотелийг гэмтээгч хүчин зүйлд хамаарах вэ?
А. Хавдар үжлийн хүчин зүйл (TNF)
В. Цитокин IL1,6,8
С. Простоциклин
D. Лейкотриенууд
E. Ялтас эсийг идэвхижүүлэгч (PAF)
16. Аль нь илүү тээлт үүсгэхэд хамааралтай вэ?
А. Менингомиелоцеле
В. Нугасны эвэрхий
С. Тархигүй ураг
D. Омфалоцеле
E. Тернерийн хамшинж
17. Дараахаас ахондроплази өвчний онцлогийг аль нь илтгэж байна вэ?
А. Аутосомийн рецессив байдлаар удамшдаг
В. Нийт тохиолдлуудаас 50%-ийн шинэ мутаци эзэлдэг
С. Кесар мэс засал цөөхөн тохиолддог
D. Өвчтэй бол нөхөн үржихүйн нас хүртлээ амьдрах нь ховор
E. Нурууны гажиг нь хүйн дарагдалд нөлөөлдөг
18. Э.., 24 настай, жирэмсний 17 долоо хоногтой. Цусны сийвэнд АФП-ы түвшин 6.0 МоМ бол дараагийн шатанд эхлээд авах авах арга хэмжээг нэрлэнэ үү?
А. АФП-ыг давтан хэмжих
В. Хэт авиан шинжилгээ
С. Амниоцентез

D. Амниографи

E. Жирэмснийг таслахыг зөвлөнө

19. А., 37 настай 10 долоо хоногтой жирэмсэн. Грейвсийн өвчтэй, бамбайн хордлогын эмчилгээнд пропилтиоурацил эмчилгээ хийлгэж байсан. Одоогоор дааврын хэмжээ хэвийн байгаа, жирэмслэхэд тохиолдож болох хүндрэлийн талаар санаа зовж байна. Эмэгтэйд өгөх зөвөлгөө аль нь зөв бэ?

A. Лейкопени болох учир эмээ уухаа зогсоох хэрэгтэй

B. Пропилтиоурацил хэрэглэсэн үед дааврын хэмжээ хэвийн, төрсөн нярай бамбайн томролтой, эмнэл зүйн хувьд бамбайн дутагдалтай төрж болно

C. Пропилтиоурацил ихсээр нэвтрэхгүй

D. Бамбайн хордлоготой эмэгтэйд тохирсон эмчилгээ хийсэн ч хожуу хордлого үүсэх эрсдэл нэмэгддэг

E. Грейвсийн өвчтэй жирэмсэн эмэгтэйд эмчилгээ хийсэн ч бамбайн дайрлага илүүтэй тохиолдоно

20. Прогестин хэрэглэхэд ургийн ямар гаж хөгжил үүсэх эрсдэлтэй вэ?

A. Хондрадисплази

B. Мэдрэлийн тогтолцооны гажиг

C. Хуруугүй төрөх

D. Гипоспади

E. Сэтэрхий уруул

21. Амниоредукци хийхэд ойролцоогоор нэг удаад хэдэн мл шингэнийг ямар хугацаанд авах нь зөв бэ?

A. 200-300 мл шингэнийг 5-8 хормын хугацаанд

B. 300-500 мл шингэнийг 10-15 хормын хугацаанд

C. 500-800 мл шингэнийг 15-20 хормын хугацаанд

D. 1000-1500 мл шингэнийг 30 хормын хугацаанд

E. 1500 -2000 мл шингэнийг 1 цагийн хугацаанд

22. Эндометриозын эмчилгээ 2 сар хийлгэсэн, нүүр халуу оргиж, үтрээ хуурайших шинж илэрсэн. Дараах эмүүдийн аль нь ийм байдал үүсгэх вэ?

A. Андрогены бэлдмэл

B. Гонадотропины релизинг дааврын агонист

C. Жирэмслэхээс хамгаалах дааврын хавсарсан бэлдмэл

D. Прогестаген

E. Стероид бус үрэвслийн эм

23. Жирэмсний төгсгөлд үтрээний цитологи шинжилгээнд ямар эс давамгайлах вэ?

A. Гадаргуугийн эс

B. Завсрын эс

C. Суурь эс

D. Суурийн хажуугийн эс

E. Суурь ба суурийн хажуугийн эс

24. Нөхөн Үржихүйн технологийн аль нь ургийн гаж хөгжил үүсгэх эрсдэл илүү вэ?

A. Хөлдөөсөн үр хөврөл шилжүүлэн суулгах

B. Өндгөвчийг хориальный гонадотропин релизинг дааврын

- аганистоор сэдээсэн
- C. Өндгөвчийг хориальный гонадотропин релизинг дааврын антогонистоор сэдээсэн
- D. Хуруу шилэнд үр тогтоосон
- E. Цитоплазмд эр бэлгийн эс тарьсан
25. Жирэмсний 32 долоо хоногтой. Хэт авиан шинжилгээнд УОШ-ний эзлэхүүн 32 см бол дараахаас аль нь байж болох вэ?
- A. Ургийн 12 нугалаа гэдэсний битүүрэл
- B. Ургийн бөөрний эмгэг
- C. Резус мэдрэгшил үүссэн
- D. HELLP хамшинж
- E. Тромбоцитопенийн пурпура
26. Резус үл тохироо үүссэн Лилейгийн муруй 3-р бүсэд байвал ямар арга хэмжээ авах вэ?
- A. Эхийн титрийг 14 хоног тутам шалгана
- B. Амниоцентез 10-14 хоноод хийнэ
- C. Хэт авиан шинжилгээгээр 7 хоног бүр ургийн шингэнийг тодорхойлно
- D. Ургаас цусны шинжилгээ авна
- E. Цус задрал бага байгааг илтгэх тул онцгой хяналтанд байлгана
27. Кесар мэс заслаар төрөх үед ялтас эс хэд бол ялтас эсийн өтгөрүүлэг хийх вэ?
- A. 20.000 мк/л
- B. 30.000 мк/л
- C. 40.000 мк/л
- D. 50.000 мк/л
- E. 80.000 мк/л
28. Анти D эсрэгбие үүсээгүй бол иммуноглобулинг урьдчилан сэргийлэх ямар тунгаар хэрэглэх вэ?
- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 300
- E. 350
29. Гонадотропины ялгаралтыг идэвхижүүлэх бэлдмэл аль нь вэ?
- A. Летрозол
- B. Синестрол
- C. Этинилэстрадиол
- D. Тамоксифен
- E. Клостильбегит
30. Хөгжил гүйцсэн тератом нь юунаас гаралтай хавдар болохыг нэрлэнэ үү?
- A. Бэлгийн татлагын хавдар
- B. Хучуурын хавдар
- C. Герминоген хавдар
- D. Мезонефرويد хавдар
- E. Завсрын эсийн хавдар
31. Бернерийн хавдар өндгөвчийн хавдрын ямар ангилалд хамаарах вэ?
- A. Үр хөврөлийн гаралтай

- B. Бэлгийн татлагын
- C. Тулгуурын
- D. Хучуурын гаралтай
- E. Даавар хамааралтай

32. Аденомиозын тархалтын ангиллын II зэрэгт хамаарахыг сонгоно уу?

- A. Умайн их биеийн зөвхөн салстад эмгэг өөрчлөлт байрших
- B. Умайн булчинт давхаргын 1/3-ийг хамарсан байх
- C. Умайн булчинт давхаргын талыг хамарсан байх
- D. Эмгэг процесс умайн бүх ханыг хамарсан байх
- E. Эмгэг процесс умайн хананаас хальж, хэвлийн гялтан, зэргэлдээх эрхтэнд үүссэн байх

33. Өндгөвчийн тератомын үед хамгийн элбэг тохиолдох хүндрэлийг нэрлэнэ үү?

- A. Хөл дээр мушгирах
- B. Хагарах
- C. Халдварлах
- D. Цус багадалт
- E. Үсэрхийлэл

34. БЮМ-ийн 24 дэх хоногт умайн хүзүүний салиа 10-12 см сунах нь юуг илтгэх вэ?

- A. Өндгөн эс гадагшлалтгүй мөчлөг
- B. Гиперандроги
- C. БЮМ-ын 2 шат богиноссон
- D. БЮМ-ийн 1 шат богиноссон
- E. Хэвийн БЮМ байгааг

35. Шээх үеийн детрузор булчингийн даралт > 70 см усны даралт, шээх хурд 5 мл/сек бол ямар эмгэг байж болох вэ?

- A. Бухимдлын шалтгаант шээс задгайрал
- B. Детрузор булчингийн хэт агшилт
- C. Детрузор булчингийн агшилтын сулрал
- D. Уретерийн бөглөрөл
- E. Давсагны үйл ажиллагаа хэвийн байгаа үзүүлэлт

36. Дараах хамшинжүүдээс аль нь умайн салстын өмөн үүсэх эрсдэлтэй вэ?

- A. Ашерманы хамшинж
- B. Бехчетийн хамшинж
- C. Элерс Данлосын хамшинж
- D. Линчийн хамшинж
- E. Марфаны хамшинж

37. Хэд хоногийн өмнө гистерэктоми хийлгэсэн, гуяны гадна урд хэсэгт мэдээ алдана гэсэн зовууртай. Ямар мэдрэлийн алдагдал үүссэн байж болох вэ?

- A. Femoral nerve
- A. Obturator nerve
- B. Peroneal nerve
- C. Pudendal nerve
- D. Ischial nerve

38. M. levator ani –г ямар булчингууд бүрдүүлэх вэ?

- A. Pubococcygeus, iliococcygeus, m. obtutatus internus

- B. Pubococcygeus, priormis, iliococcygeus
- C. Pubococcygeus, puborectalis, iliococcygeus
- D. Pubococcygeus, iliococcygeus, m. gracilis
- E. Pubococcygeus, piriformis, m. transversus profundus

39. Эмэгтэй 35 настай, умайн хүзүүний эсийн шинжилгээнд CINIII, хангалтгүй кольпоскопи хийгдсэн. Конус биопсийн шинжилгээгээр хавтгай хучуурын өмөн суурин мембраны 1 мм орчим хүрээг хамарсан. Лимфийн зангилаанд үсэрхийлэлгүй. Энэ өвчтөнд ямар онош тавих вэ?
- A. Бага ялгаралтай хорт хавдар
 - B. Бичил цөмрөлтөт өмөн
 - C. ASCUS
 - D. Эсийн доторх өмөн
 - E. Инвазив өмөн II а үе шат
40. Хэвлийн урд хананы өнгөц судасжилтанд аль судас оролцох вэ?
- A) A. epigastrica superior
 - B) Superficial circumflex artery
 - C) A. epigastrica inferior
 - D) A. iliaca circumflex
41. Аорт аль нугаламын түвшинд ташааны ерөнхий 2 артери болж салаалдаг вэ?
- A) Сээрний 12-р нугаламын түвшинд
 - B) Бүсэлхийн 2-р нугаламын түвшинд
 - C) Бүсэлхийн 4-р нугаламын түвшинд
 - D) Ууцны 1-р нугаламын түвшинд
42. Хэвлийд хийлэгч гуурсаар орох хийн хурд нь 1 минутанд хэд байвал зохистой вэ?
- A) 1 минутанд 1-2 литр
 - B) 1 минутанд 3-4 литр
 - C) 1 минутанд 4-5 литр
 - D) 1 минутанд 0,5 литр
43. Мэс заслын үед умайд оруулж, умайг хөдөлгөж чиглүүлэх үүрэгтэй багаж аль нь вэ?
- A) Ретрактор
 - B) Манипулятор
 - C) Морцеллятор
 - D) Граспер
44. Умайн гаднах жирэмсний үед тубэктоми мэс засал хийхэд аль заалт хамаарахгүй вэ?
- A) Задарсан үрийн хоолойн жирэмслэлт
 - B) Олон давтамжит үрийн хоолойн жирэмсэн
 - C) Үүсгэвэрийн хэмжээ 2 см-с бага
 - D) Булангийн жирэмсэн
45. Дурангийн миомэктоми мэс заслын үед умайд оёдол тавихад илүү оновчтой утас?
- A) Vicryl
 - B) Monocryl
 - C) V-loc
 - D) Polypropylen

46. Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар тохиолдолд тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн өмнө үйлчлүүлэгчээс шийдвэрийг бичгээр авах вэ?

- A. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх
- B. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх
- C. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх
- D. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх *
- E. Үйлчлүүлэгчид сэтгэцийн хувьд эрүүл бус байх

47. "Эмнэлгийн мэргэжилтэн" тодорхойлолтыг сонгоно уу

- A. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг
- B. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, уламжлалтын их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг
- C. Хүний их, бага эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг
- D. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг
- A. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг

48. Хэрэв эмнэлгийн мэргэжилтэн өөрийн хувийн эмнэлэгтэй, эсвэл хувийн эмнэлэгт хавсран ажилладаг бол ёс зүйн үүдээс ямар зарчим баримтлах вэ?

- A. Зайлшгүй илгээх тохиолдолд үйлчлүүлэгчид үнэнийг хэлнэ

- B. Зах зээлийн нийгэм юм чинь өөрийн болон ажилладаг эмнэлэгтээ илгээхэд буруудахгүй, учир нь хүний эрүүл мэнд чухал
- C. Уг асуудал хүний эрх / хувь эмнэлгийн мэргэжилтний / асуудал
- D. Одоо цагт хувийн эмнэлэг төрийн эмнэлгээс илүү үйлчилж байгаа учир бололцоотой асуудал
- E. Би төрийн өмчийн эмнэлэгт ажилладаг учир надад хамаагүй

К ХЭЛБЭРИЙН ОЛОН СОНГОЛТТОЙ СОРИЛ

- К хэлбэрийн олон сонголттой сорил. Энэ хэлбэрийн сорилын сонголтууд нь 1, 2, 3, 4, 5 гэсэн тоогоор дугаарлагдсан байх ба тэдгээрээс нэг болон хэд хэдэн хариултыг сонгоод дараах түлхүүрийг ашиглан тэмдэглэнэ.

Түлхүүр: 1, 2, 3 гэсэн дугаарыг сонгосон бол	A	
1, 2, 3, 4 гэсэн дугаарыг сонгосон бол	B	
2, 4 гэсэн дугаарыг сонгосон бол		C Зөвхөн 4 гэсэн
дугаарыг сонгосон бол		D 1, 2, 3, 4, 5
буюу бүх дугаарыг сонгосон бол E үсгээр тус тустэмдэглэнэ.		

49. Ургийн хромосомын эмгэгийн илрүүлгийн маркеруудыг нэрлэнэ үү

1. Хүний цэлмэнгийн гонадтропин
2. Жирэмсэнтэй холбоот сийвэнгийн A уураг
3. Альфафетопротейн
4. Ихсийн өсөлтийн хүчин зүйл
5. Умайн артерийн лугшилтийн индекс

50. Хэт авиан Допплер шинжилгээний индексүүдийг нэрлэнэ үү

1. Агшилтын дээд хурд
2. Эсэргүүцлийн индекс
3. Тархи ихсийн харьцаа
4. Лугшилтын индекс
5. Сулралын муруй

51. Резус сөрөг цустай эмэгтэйн урагт цус багадалтын үнэлгээ хийхэд Допплер шинжилгээний аль үзүүлэлтийг ашиглах вэ

1. Агшилт сулралын харьцаа
2. Эсэргүүцлийн индекс
3. Лугшилтын индекс
4. Агшилтын дээд хурд
5. Сөрөг урсгал

52. Ургийн хромосомын эмгэгийн оношилгоонд алийг өргөн ашигладаг вэ

1. Хоёрлол тест
2. Цэлмэнгийн биопси
3. Ургийн шилний арын зайн зузаан хэмжилт (NT)
4. Амниоцентез
5. Гурвал тест

53. Манас таталтын урьдлын илрүүлэгт алийг ашиглах вэ?

1. Дундаж артерийн даралт
2. Умайн артерийн лугшилтын индекс
3. Эхийн өгүүлэмж
4. Ихсийн өсөлтийн хүчин зүйл
5. Жирэмсэнтэй холбоот сийвэнгийн А уураг

54. Жирэмсний эхний 3 сартайд ургийн NT зузаарал юутай хамааралгүй вэ

1. Дауны хамшинж
2. Ургийн өсөлт саарах хамшинж
3. Птаугийн хамшинж
4. Манас таталтын урьдал
5. Эдвардсын хамшинж

55. Ургийн шилэн хүзүүний арын зузаан (NT) хэмжилт хийхэд хамаарах үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү

1. Ургийн зулай ахар сүүлний урт
2. Ургийн зүрхний цохилтын тоо
3. Ургийн байрлал
4. Нүүрний төвийн зүслэг
5. Ихсийн байрлал

56. СА 125 үзүүлэлтийг өндгөвчийн ямар хавдрын оношилгоонд түлхүү анхаарах вэ?.

1. Үр хөврөлийн гаралтай хавдар
2. Өндгөвчийн хучуурын сероз эсийн хавдар
3. Өндгөвчийн хучуурын муцинт эсийн хавдар
4. Эндометройд хавдар
5. Гранулоз эсийн хавдар

57. Хучуурын гаралтай хавдрын хяналтанд аль маркеруудыг ашиглах вэ?

1. HE4
2. CA125
3. CEA
4. CA 19.9
5. AFP

58. Гранулоз эсийн хавдрын дахилтанд аль маркер илүү мэдээлэлтэй вэ?

1. Ингибин А
2. Антимюллерын даавар
3. АФП
4. Ингибин В
5. CA125

59. Элгэн доторхи цөс зогсонгшил нь ямар хүндрэл үүсгэх вэ?

1. Гэдэс зунгаагаар түгжрэх
2. Ураг амьгүй болох
3. Дутуу төрөх
4. Ургийн халдвар
5. Ургийн өсөлтийн саатал

60. Хэт авиан шинжилгээнд ихэс зузаан бол ямар эмгэгийг сэжиглэх вэ?

1. Тамхи таталт
2. Чихрийн шижин
3. Гаж хөгжил
4. Тэмбүү

5. ХДХВ-ийн халдвар

61. Цусанд Альфафетопротейн багасах нь урагт ямар эмгэг байгааг илтгэх вэ?

1. Омфалоцеле
2. Ананцефали
3. Ихэс ховхролт
4. Трисоми
5. Ураг амьгүй болох эрсдэлтэй

62. Цитомегаловирусийн халдвар урагт ямар эмгэг үүсгэх эрсдэлтэй вэ?

1. Микроцифали
2. Оюун ухааны хомсдол
3. Мархины шохойжилт
4. Сохрох
5. Мөчдийн гажиг

63. Тэнэгч мэдрэлийн (n.vagus) хүчдэл ихэссэнээс жирэмсэн эмэгтэйд ямар шинж илэрч болох вэ?

1. Амтлах мэдрэхүй өөрчлөгдөх
2. Дотор муухайрах
3. Шүлсний ялгарал ихсэх
4. Өтгөн хатах
5. Зүрх дэлсэх

64. Хэсэгчилсэн цулцан хураагийн бүрэн цулцан хураанаас ялгарах онцлог шинжийг нэрлэнэ үү

1. Кариотип 46ХУ
2. Өндгөвчинд шар биеийн уйланхай үүсэх нь ховор
3. Хавдарт шилжих эрсдэл илүү
4. Үсэрхийлэх нь бага
5. Умайн хэмжээ ихэвчлэн жирэмсний хугацаанаас том байдаг

65. Ургийн халдварын тархалтын үнэн зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. ХДХВ -ийн халдвар эхээс урагт дамжих эрсдэл 15-20%
2. Парвовирус халдвар жирэмсэн үед ойролцоогоор 3% тохиолдох ба урагт цус багадалт үүсгэнэ
3. В вирусийн гепатитийн урьдчилан сэргийлэлт хийхгүй бол урагт халдвар дамжих эрсдэл 50%
4. Цус задлагч стрептококк нь урагт хүнд хэлбэрийн халдвар үүсгэнэ
5. Токсоплазмын халдвар жирэмсний 3 дах 3 сард урагт халдвар дамжих эрсдэл 15%

66. Антифосфолипид хамшинжийн үед тохиолдох хүндрэлийг нэрлэнэ үү?

1. Жирэмсний хожуу хордлого
2. Эрт үеийн зулбалт
3. Ураг амьгүй болох
4. Ургийн өсөлт саарах
5. Тромбоцитопени

67. Ихсийн судасны хөгжлийг зохицуулахад оролцох хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү

1. sFlt-1
2. VEGF

3. Р

G

F

4. Р

P

-

1

3

5. Эндоглин

68. Жирэмсэн үед гепатит С-тэй хамааралтай зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?

1. HIV-тай хавсрах нь эхээс урагт халдах эрсдэл нэмэгдэнэ.
2. Жирэмсэн үед интерферон хэрэглэх нь эсрэг заалттай
3. Жирэмсэн үед С гепатитын хурц хэлбэр ховор тохиолдоно.
4. Эхээс урагт халдах эрсдэл 3-5%
5. Вирусын ачаалал $>2.5 \times 10^6$ copies/ml DNA бол өндөр гэж үзнэ

69. Ураг орчмын шингэнд дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь ургийн уушгины хөгжлийн зэргийг таамаглах шалгуур болох вэ?

1. Лецитин
2. Спингомиелин
3. Фосфатидилглицерол
4. Катехоламин
5. Кортизол

70. В вирусын гепатиттай холбоотой зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү?

1. Босоо замаар халдвар дамжих эрсдэл ихсээр дамжихаас бага
2. HbeAg эсрэг төрөгч илрэх нь халдварын далд үе шатыг илэрхийлнэ
3. В вирусын гепатит жирэмсний эхний 3 сард үүсвэл ургийн гаж хөгжил үүсгэнэ
4. Вирусын ачаалал өндөр бол 28 долоо хоногтойгоос вирусын эсрэг эм хэрэглэнэ
5. Халдвартай эхээс төрсөн нярайд 12 сарын дараа шинжилгээ хийнэ.

71. Умайн хэт эрчимжил үүссэн бол дараах эмүүдээс алийг хэрэглэх вэ?

1. Гинипрал
2. Тербуталин
3. Ретодрин
4. Сальбутамол
5. Нитроглицерин

72. Аденокарцинома үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү

1. Эстрогений илүүдэл
2. Таргалалт
3. Чихрийн шижин
4. Артерийн даралт ихдэх өвчин
5. Өндгөвч уйланхайжих хамшинж

73. Үтрээний эсийн шинжилгээнд суурин орчмын болон суурин эс давамгайлсан байх нь юуг илэрхийлэх вэ?

1. Прогестерон дааврын хэт дутагдал
2. Эстроген дааврын дутмагшил

3. Эстроген болон прогестерон дааврын дутагдал
4. Цэвэршилт
5. ЛД –ын дутагдал

74. Киари- Фромеллийн хамшинжийн үед илрэх эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?

1. Умай жижигрэх
2. Биений юмгүйдэл
3. Пролактин ихсэх
4. Үсжих
5. Өндгөвч томрох

75. Умайн хүзүүний цагаарал нь:

1. Ихэвчлэн 30-35 насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно
2. Олон үет хучуурын эсүүд эвэршин зузаарах
3. Гадаргуугийн үенүүд нь нимгэрч суурин эсүүд зузаарна
4. Доод талын эдүүдтэйгээ нягт наалдана
5. Богино хугацаанд өмөнд шилжинэ

76. Үйл ажиллагааны ямар сорилууд эстроген дааврын ханалтыг тодруулдаг вэ?

1. Хүүхэн харааны шинж
2. Кариопикнетик индекс
3. Оймын навчны шинж
4. Суурин халууны шинж
5. Кольпоцитологи

77. Умайн ёроолын тунгалагийн урсгал нь аль зангилаанд цутгах вэ?

1. Ташааны гадна зангилаанд
2. Ташааны дотор тунгалагийн зангилаанд
3. Цавины өнгөц тунгалагийн зангилаанд
4. Гол судасны зангилаанд
5. Давсаг орчмын зангилаанд

78. Аль нь даавар идэвхт хавдар вэ?

1. Мөхлөгт эсийн хавдар
2. Тека эсийн хавдар
3. Андробластома
4. Тератома
5. Десгерминома

79. Умайн хүзүүний шилжилтийн бүс өргөсөх шалтгааныг нэрлэнэ үү?

1. Жирэмсэн үед
2. Бэлэг бойжлын үед
3. Дааврын хавсарсан бэлдмэл удаан хугацаагаар хэрэглэсэн үед
4. ХПВ–ийн халдвартай үед
5. Цэвэршилтийн дараа

80. Төрөлхийн адрено- гениталь хамшинжийн эмгэг жамын онцлог нь юу вэ?

1. 21-гидроксилаза ферментийн дутагдалын шалтгаант завсрын бодисын эмгэг хуримтлал
2. АКТД–ын ялгарал ихэснэ
3. Бөөрний дээд булчирхайн холтослогийн хэт зузаарал
4. Стероид даавруудын нийлэгжилтийн хямрал
5. Цусан пах кортизолын түвшин өндөр байдаг

81. Тестикулийн феминизаци гэдэг нь

1. Андрогенд мэдрэг бус болох
2. Фенотип – эмэгтэй
3. Генотип – эрэгтэй
4. Кариотип – 46 ХҮ
5. Бэлгийн эсийн хавдар үүсэх эрсдэл өндөр

82. Умайн хүзүүнээс их хэмжээтэй цус алдаж байгаа бол дараах цус тогтоох аргуудаас алийг нь хэрэглэх вэ?

1. Судас бөглөх
2. Монселийн уусмал
3. Транексамийн хүчил
4. Туяагаар шарах
5. Люголоор түлэх

83. Симондсын хамшинжийн эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү

1. Бодисын солилцооны гүнзгий өөрчлөлт
2. Эрт хөгшрөл явагдах
3. Хэт их турах
4. Яс сийрэгжих
5. Сэтгэцийн өөрчлөлт илрэх

84. Харааны товгор (гипофиз)-оос дараах дааврууд ялгарна:

1. Рилизинг- даавар
2. Станины даавар
3. Вазопресин
4. Окситоцин
5. Мелатонин

85. Хламидийн халдварын хүндрэлийг нэрлэнэ үү

1. Гуурсан хоолой, өндгөвчний буглаа
2. Гуурсан хоолойн үргүйдэл
3. Filz-Hugh-Curtis хамшинж
4. Аарцгийн эрхтний хурц үрэвсэл
5. Менорраги

86. Биений юмны өмнөх хамшинжийн үед аль эмчилгээний аргыг сонгох вэ?

1. Тайвшруулах эмчилгээ
2. Жирэмснээс хамгаалах хавсарсан дааврын бэлдмэл
3. Витамин В6
4. Флуоксатин (SSRI)
5. Давс хязгаарлах

87. ГнРД –ын адил (агонист) эмүүд хэрэглэн эмчилж болох эмгэгүүд нь:

1. Эндометриоз
2. Умайн хоргүй хавдар
3. Умайн салстын хэт зузаарал
4. Умайн гаралтай биений юмгүйдэл
5. Өндгөвчийн анхдагч дутагдал

88. Киари- Фромеллийн хамшинжийн үед хэрэглэх эмийг нэрлэнэ үү?

1. Кломифен
2. Эстроген

3. Метилдофа
4. Бромкриптин
5. Прогестерон

89. Өндгөвчийн эрт цуцах (эрт дутагдах) хамшинж үүсэхэд хүргэх шалтгаан нь:

1. Удамшлын шалтгаан
2. Нөхөн үржихүйн насанд фолликулын сөнөрөл хэт идэвхитэй явагдах
3. Туяаны үйлчлэл
4. Улаануудын халдвар
5. X хромосомын дутагдал

90. Бэлгийн бойжилт урьтаж явагдаж байгаа шинж илэрсэн охидод шалтгааныг тодруулахаар зайлшгүй хийгдэх шинжилгээ нь:

1. Хэт авиан шинжилгээ
2. Дааврын шинжилгээ
3. Ясны рентген шинжилгээ
4. MRI тархины
5. АнтиМюллер даавар тодорхойлох

91. Марсупиализаци мэс ажилбарын зорилго нь юу вэ?

1. Хурсан шингэн, идээг гаргах
2. Бартолин булчирхайд цорго шинээр үүсгэх
3. Бартолин булчирхайг авах
4. Бартолин булчирхайг үлдээх
5. Бартолин булчирхайг буглааны гэрийн хамт авах

92. Төрсний дараа мэдрэл саажилт үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү

1. Төрөлтийн үед удаан хугацаагаар өвдөг нугалаатай байх
2. Шилбэний нарийн ясны толгойд даралт учирсанаас
3. Дүлэх үед гарын алганд даралт учирсанаас
4. Мак Робертсийн байрлалын үед
5. Хэвлий дээр дарах үед

93. Дутуу төрөлтийн үед токолитик хэрэглэхтэй холбоотой зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. Токолитик эмчилгээг 48-72 цаг хэрэглэхэд үр дүн илүү сайн байна
2. Токолитик нь стероидын үйлчлэх хугацааг гүйцээхэд ач холбогдолтой
3. Манас таталтын урьдлын хүнд хэлбэрийг төрөх замаар төрүүлэхээр бол стероид үйлчилтэл хэрэглэхийг зөвлөнө
4. Индометациныг жирэмсний 32 долоо хоногос хойш хэрэглэхгүй
5. Нифедипиныг зөвхөн 32 долоо хоног хүртэл хийнэ

94. Бамбайн эмгэг жирэмсэнтэй хавсарсан үеийн зөв мэдээллийг нэрлэнэ үү

1. Жирэмсний эхний 3 сард бамбай идэвхижүүлэгч дааварын түвшин нэмэгдэнэ
2. Анхдагч гипотиреозыг Т4-өөр оношлох нь илүү ач холбогдолтой
3. Гипертироидизмын үед тироксин холбогч уураг буурна
4. Хэт авиан шинжилгээгээр ургийн бамбай том бол БИД-ын авуурын эсрэг биеийн шинжилгээ хийх шаардлагатай
5. Жирэмсний эрт үеийн бөөлжилттэй эмэгтэйчүүдэд бамбайн шинжилгээг хийх шаардлагатай

95. Яаралтай жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудыг нэрлэнэ үү?

1. Левоноргестрол
2. Дааврын хавсарсан эм
3. Зэс агуулсан ерөндөг
4. Улипристал ацетат
5. Үтрээ угаах

96. Кесар мэс заслын үед юуг хориглоно гэж заасан бэ?

1. Шаардлагагүй бол умайн хоргүй хавдрыг авах
2. Шаардлагагүй тохиолдолд умайг шархаар ил гаргах
3. Умайн шархаар умайн хүзүүг хуруугаар тэлэх
4. Өөхөн эд зузаан биш бол оёдол тавих
5. Умайн хөндийг халдвараас сэргийлэх уусмалаар угаах

97. Ёс зүйн хүрээнд эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчдэд ямар тохиолдолд шууд нөлөө үзүүлэх ёсгүй бэ?

1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахад нь
2. Харьяалал харгалзахгүй үйлчлүүлэхэд нь
3. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах байгууллага, эмчээ сонгох эрхээ эдлэхэд

нь

4. Эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд нь
5. Шилжин суурьшихад нь

98. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчдэд тохиолдож болзошгүй хүчирхийллийн нөлөөлөлд хэрхэн хандах ёс зүйн үүрэгтэй вэ?

1. Уг асуудлын учир холбогдлыг сайн мэдэхгүй байна
2. Энэ нь эмнэлгийн мэргэжилтний ажил үүрэгт төдийлэн хамааралгүй
3. Энэ төрийн бус байгууллагын үүрэг
4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
5. Энэ нь хуулийн байгууллагын ажил үүрэгт хамрагдах учраас бидэнд


холбогдолгүй

УЯЛДУУЛАН СОНГОХ СОРИЛ

99. Дараах шинж тэмдгүүдийг өндгөвчийн ямар хавдрын үед илэрдэг болохыг тохируулан тавина уу

1. Вирилизацийг өдөөнө
2. Умайн салстын өмөн үүсэх давтамжыг нэмэгдүүлнэ
3. Аарцгийн рентген шинжилгээнд шохойжилт илэрнэ
4. Хавдарт шилжих нь үр хөврөлийн эдээс хамааралтай
5. Аденокарциномын үсэрхийлсэн хавдар
 - A. Гранулёзын хавдар
 - B. Сертоли-Лейдига эсийн хавдар
 - C. Бүрэн хөгжөөгүй тератома
 - D. Гонадобластома
 - E. Крукенбергийн хавдар

100. Аарцгийн ёроолын зурагны эхний 1-5 дугаартай сум заасан булчинг доор бичсэн нэртэй нь тохируулан тавина уу?



1. 1-р сум
 2. 2-р сум
 3. 3-р сум
 4. 4-р сум
 5. 5-р сум
- A. m. superficialis transvers perineal
 - B. m.sphincter ani
 - C. m.bulbospongiosus
 - D. m.ishiocavernosus
 - E. perineal body

